




Desinfektionsplan bei behördlich angeordneter Entseuchung gemäß Infektionsschutzgesetz § 18






Nach § 18 (1) IfSG dürfen „nur Mittel und Verfahren verwendet werden, die von der zuständigen Bundesoberbehörde in einer Liste im Bundesgesundheitsblatt bekannt gemacht worden sind“. Nach § 18 (2) IfSG ist die zuständige Bundesoberbehörde für die Bekanntmachung von Mitteln und Verfahren zur Entseuchung das Robert Koch-Institut.

Was? Maßnahmen	Wann? Häufigkeit	Womit?			Wie? Durchführung
		Präparat/Produkt	Konz.	EWZ	

Umfasst das geforderte Wirkungsspektrum **Bakterien und Pilze**, so sind Produkte mit dem **Wirkungsbereich A (Bakterien und Pilze)** der RKI-Liste für die Desinfektion einzusetzen.

Hygienische Hände-desinfektion 	Nach pflegerischen und vor therapeutischen Maßnahmen. Bei tatsächlicher wie fraglicher Kontamination der Hände mit erregerhaltigen Materialien. Auch bei Benutzung von Handschuhen.	Sterillium® - einreiben -	gebr.-fertig	30 Sek.	Präparat in die hohlen, trockenen Hände geben und gemäß Standard-Einreibemethode (EN 1500) über die gesamte Einwirkzeit hinweg bis zu den Handgelenken kräftig einreiben. Hände über die gesamte Einwirkzeit feucht halten. Bei Tb ist eine zweimalige Anwendung erforderlich.
		Amphisept® E - einreiben -	gebr.-fertig	30 Sek.	
		Sterillium® Virugard - einreiben -	gebr.-fertig	30 Sek.	
Instrumenten-reinigung-desinfektion 	Nach Gebrauch.	Bodedex® forte - reinigen -	0,5–1 %	5–10 Min.	In Lösung vollständig und ohne Luftblasen einlegen. Einwirkzeit genau einhalten. Gründlich unter fließendem Wasser abspülen. Lösung mind. 1 x täglich erneuern. Der weiteren Aufbereitung zuführen.
		Korsolex® basic - desinfizieren -	4 %	30 Min.	
		Aseptisol® - desinfizieren -	3 %	2 Std.	
Flächen-desinfektion 	Nach ärztlicher Anordnung.	Dismozon® pur	4 %	1 Std.	Durchführung der Scheuer-Wisch-Desinfektion von Personen mit entsprechender Fachkenntnis.
		Bacillocid® Spezial	6 %	4 Std.	
		Kohrsolin®	3 %	4 Std.	

Umfasst das geforderte Wirkungsspektrum **Viren**, so sind Produkte mit dem **Wirkungsbereich B (Viren)** der RKI-Liste für die Desinfektion einzusetzen.

Hygienische Hände-desinfektion 	Nach pflegerischen und vor therapeutischen Maßnahmen. Bei tatsächlicher wie fraglicher Kontamination der Hände mit erregerhaltigen Materialien. Auch bei Benutzung von Handschuhen.	Sterillium® Virugard - einreiben -	gebr.-fertig	2 Min.	Präparat in die hohlen, trockenen Hände geben und gemäß Standard-Einreibemethode (EN 1500) über die gesamte Einwirkzeit hinweg bis zu den Handgelenken kräftig einreiben. Hände über die gesamte Einwirkzeit feucht halten.
		Bodedex® forte - reinigen -	0,5–1 %	5–10 Min.	
		Korsolex® basic - desinfizieren -	3 %	1 Std.	
Instrumenten-reinigung-desinfektion 	Nach Gebrauch.	Aseptisol® - desinfizieren -	4 %	2 Std.	In Lösung vollständig und ohne Luftblasen einlegen. Einwirkzeit genau einhalten. Gründlich unter fließendem Wasser abspülen. Lösung mind. 1 x täglich erneuern. Der weiteren Aufbereitung zuführen.
		Bodedex® forte - reinigen -	0,5–1 %	5–10 Min.	
		Korsolex® basic - desinfizieren -	3 %	1 Std.	
Flächen-desinfektion 	Nach ärztlicher Anordnung.	Dismozon® pur	4 %	1 Std.	Durchführung der Scheuer-Wisch-Desinfektion von Personen mit entsprechender Fachkenntnis.
		Bacillocid® Spezial	6 %	4 Std.	
		Kohrsolin®	3 %	4 Std.	

